

Применение препаратов при разных стадиях сердечной недостаточности

	A1	B1-2	B3	C2	C3-4	D 3-4
ИАПФ	B	A	A	A	Ax2	Ax2
Ветмедин	A мин	A мин	A макс	A макс	A макс	A максx2
Фурос/тора		C мин	C макс	C мин	C макс	C макс
Спиронолактон	B мин	B мин	B сред	B сред	B макс	B макс
Гипотиазид					C мин	C мин
БАБ	C	C	C	C		
Дигоксин						
Силденафил				B	B	B
Омега 3	C	C	C	C	B	B
Диета	C	C	C	C	C	C

ИНДЕКСЫ

(A – применять всегда, B – применять желательно, C – применять не обязательно)

A - НЕТ ЗАСТОЯ ДЖМП есть ремоделирование, снижение общей сократимости меньше 20% (рентген Эхо)

B - ЕСТЬ ЗАСТОЙ есть венозный застой, нет легочной гипертензии

C - смешанный застой, высокая легочная гипертензия, застой в большом круге, гепатомегалия, асцит, гидроторакс

D - тяжелые нарушения кровообращения, кахексия, поражение почек

Индекс А

1 ФК ИАПФ Ветмедин
--------------------------

Диета БАБ Омега

Индекс В

1 ФК	2 ФК	3-4 ФК
ИАПФ Ветмедин <u>Диета !!!</u> Спиронолактон мин	ИАПФ Ветмедин Спиронолактон мин <u>Фурос/ Тора мин!!!</u> Диета	Ветмедин МАКС Спиронолактон макс <u>Фурос/ Тора макс!!!</u> Диета

Омега БАБ

Омега БАБ

Индекс С

2 ФК	3-4 ФК	3-4 ФК Рефрактерный
ИАПФ Ветмедин макс Диета Спиронолактон мин <u>Фурос/ Тора мин!!!</u>	ИАПФ Ветмедин макс Спиронолактон мин <u>Фурос/ Тора мин!!!</u> Диета	ИАПФ x2 Ветмедин x2 Спиронолактон макс <u>Фурос/ Тора макс!!! парентерально</u> <u>Гипотиазид!!!</u>

Омега БАБ

Омега (БАБ не назначать или снизить дозу)

Дигоксин!